

CO2 Laser Fraccionado para Cicatrices, Estrías y Genitales



Instrucciones

No remover la cura por 7 días. Una herida con humedad controlada y medicación apropiada cicatriza mejor que una seca y costrosa, es por ello que no se manipulan las heridas quirúrgicas no contaminadas.

En zonas como el abdomen las curas duran mucho más que las curas vulvares. Si hay necesidad de retirar la cura antes del día 7 las heridas deben mantenerse lo más húmedas posible y ser cubiertas con gasa luego de aplicar bacitracina o mupirocina 3 veces al día hasta completar 7 días

Después del rejuvenecimiento vulvovaginal utilizará Gynotran o Gynomet crema vaginal todas las noches durante 7 noches y aplicará bacitracina o mupirocin 3 veces al día en los labios menores y la entrada vaginal (introito vaginal y vestibulo vaginal)

Aun cuando el procedimiento aparenta ser inocuo tomamos seriamente todas las medidas necesarias para evitar complicaciones y obtener el resultado estético/funcional más cercano a sus deseos

2.- Si la cura se despegó antes del día 7:

- Si la cura se ve en buenas condiciones déjela en su sitio
- Podría remover la cura si está muy separada, lave la herida con agua y jabón suave
- Aplique bacitracina o mupirocin 2-3 veces al día y cubra con gasa. Si la gasa se adhiere a la piel humedezca con abundante agua para que se desprenda sin tracción de su parte.
- La herida debe estar cubierta por 7 días para evitar traumatismos y facilitar una cicatrización estética y sin complicaciones infecciosas (evento sumamente raro)

3.- Después de 7 días:

- Al retirar la cura el tejido debe estar totalmente curado, puede haber algo de secreción y restos del medicamento aplicado que deberán ser lavados con agua y jabón. Se considera de alta para esta sesión. Debe enviar una foto vía whatsapp al 04142708338
- Si se le indica debe continuar aplicando bacitracina o mupirocin hasta obtener cicatrización completa SIN cubrir con gasa en lo sucesivo, a menos que se le indique lo contrario
- De ser necesarias nuevas sesiones estas se indicarán cada 4 semanas (usualmente solo se requieren 1 o 2 sesiones).
- Puede utilizar cremas hidratantes porque el proceso de reestructuración sigue hasta por 3 meses.
- No hay restricciones para actividad física pero si la zona tratada está expuesta al sol se recomienda aplicar protección solar SPF50

SEÑALES DE ALARMA Y REPORTE

04142708338

- Dolor de la herida (usualmente al 5-7 día)
- Fiebre
- Inflamación de la herida o enrojecimiento a su alrededor
- Secreción o mal olor de la herida

Tensado Vaginal

Flujo vaginal anómalo fetido anormal
Dolor pelviano